

डेरी समाचार

चौमासिक

वर्ष : २३

अंक : ३

२०७२ चैत्र - २०७३ आषाढ

March - June 2016

पूर्णाङ्क - ५४

सम्पादकीय

पशुपालन व्यवसायको लामो इतिहास रहेको छ । यो एउटा प्राविधिक विधा भएको हुनाले यसको सञ्चालन वैज्ञानिक हुनै पर्दछ । पशुपालनका मुख्यगरी नश्ल (Breed), पशु आहारा (Feed), पशु स्वास्थ्य (Health) र बजार (Market) गरी चार वटा आधार भूत पक्षहरू रहेका छन् । यी मध्ये नश्ल महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसको अनुपस्थितिमा अन्य पक्षहरू अर्थहीन हुन्छन् । यसर्थ यस अंकमा नेपालमा पाईने गाई भैंसीका जातहरू र उन्नत जातका गाई भैंसीका श्रोत केन्द्रको बारे जानकारी गराउने प्रयास भएको छ । भनिन्छ "बीउ राम्रो त खेती राम्रो" । "छोराछोरी कूलका, पानी मूलको" भन्ने नेपाली उखान आज पनि त्यतिकै सान्दर्भिक रहेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले आ.व. ०७०/०७१ को बजेट वक्तव्य देखि सहकारी तथा निजीस्तरमा अनुदान र प्राविधिक सहयोगमा उन्नत गाईभैंसीका श्रोत केन्द्रहरू स्थापना कार्य जारी राखेको सन्दर्भमा नयाँ व्यवसायीका लागि यी श्रोतकेन्द्रहरू उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

उन्नत गाई भैंसी श्रोत केन्द्रहरूको विवरण

जिल्ला	संचालकको नाम	सम्पर्क नं.	पशु संख्या	उत्पादन क्षमता (दूध लि.) / वेत	कैफियत
मोरङ	यादप प्र. ठकाल	९८४२०२६७५८	११७	२१००-३६००	जर्सि कस, होल्स्टिन कस
सप्तरी	कृति प्र. तिवारी	९८४२९२६१७५	८७०	४२००-६६००	"
चितवन	भगिरथ तिमिल्लीना	९८४५०५४६९७	११०	६६००-६९००	"
नवलपरासी	गोपाल श्रेष्ठ	९८४५०५१६३५	१०२५	३६००-६६००	"
रूपन्देही	शसि पौडेल	९८५७०२५९८८	४००	३९००-४२००	"
दाङ	मिनराज अधिकारी	९८५७८४०२७३	१४६	३९००-५१००	"
कञ्चनपुर	रघुवर प्र. लेखक	९८४८८३६६९५	१४४	३०००-६०००	"
धनुषा	श्याम कु. महतो	९८४४०४७२८७	१५५	१२००-१५००	मुरा कस
सर्लाही	सुरेश कार्की	९८५४०३५४१८	१५०	१५००	"
कपिलवस्तु	राजु बेल्लासे	९८४९१३४२९०	२२०	१५००-१८००	"

नेपालमा पाईने गाई भैंसीका जातहरू

१. गाईका जात

(क)स्थानीय जातहरू

१. अछामी गाई :- यस गाईको उत्पत्ति अछाम जिल्लामा भएको भएता पनि वझाङ्ग, बाजुरा र डोटीमा समेत पाईन्छ । यसलाई संसारको सबैभन्दा सानो गाई मानिएको छ । यस गाईलाई नौमुट्टे गाई पनि भनिन्छ । यसको रंग कालोदेखि सेतो, खैरो, खरानी, टाटेपाटे आदि हुन्छ । यसको उचाई १ मिटरभन्दा कम, शारिरीक तौल १२० देखि १५० के.जी. सम्म भएको, दानापानी कम खाने र रोग कम लाग्ने हुन्छ । कमसल खालको आहारा खाएर पनि राम्रो उत्पादन दिने, यसको साँढे तथा गोरु सुर्का जोत्न उपयुक्त हुन्छ । यो करिव ४ वर्षको उमेरमा बयस्क भई ५ वर्षको उमेरमा पहिलो वेत व्याउछ । २२५ दिनको दुहुनो अवधिमा दैनिक औसत दूध उत्पादन १-४ लिटरसम्म दिएको पाईन्छ । दुई वेतको अन्तर औसत १२ देखि २४ महिनाको हुन्छ । यसको संख्या घट्दै गएकोले संरक्षण गर्न आवश्यक छ ।



बासुदेव नाथ

पशु विकास अधिकृत
केन्द्रीय गाईभैंसी प्रवर्द्धन कार्यालय,
हरिहर भवन, ललितपुर



२. लुलु गाई:-

यस गाईको उत्पत्ति स्थान मुस्ताङ्ग भएता पनि डोल्पा र मनाङ्गमा समेत पाइन्छ । **जुरो नभएको**, उच्च हिमाली भेगका सुख्खा चिसोमा पनि हुर्कन सक्ने, होचो कद, लामो पुच्छर,



छोटा खुट्टा, बाक्ला रौं हुन्छ । यसको रंग कालोदेखि सेतोसम्म बिभिन्न हुन्छ । बयस्क भालेको शारीरिक तौल १५० देखि २२५ के.जी. सम्म हुन्छ भने माउँको १२० देखि १६० के.जी. हुन्छ । यो करिव ३.५ वर्षको उमेरमा बयस्क भई ४.५ वर्षको उमेरमा पहिलो वेत व्याउछ । यसले १६५ दिनको दुहुनो अवधिमा दैनिक औसत दूध उत्पादन १.६ लिटर दिन्छ । दुई वेतको अन्तर औसत १२ देखि २४ महिना हुन्छ । यसको संख्या घट्दै गएकोले संरक्षण गर्न आवश्यक छ ।

३. खैला गाई:-

यसको उत्पत्ति सुदूर पश्चिमान्चल क्षेत्रको पहाडी जिल्ला खासगरी बैतडी, डडेल्धुरा, डोटी भएको पाईन्छ । यो **कम उत्पादन क्षमता भएको**, सामान्य व्यवस्थापनमा



पनि उत्पादन गर्न सक्ने, रिसालु स्वभाव, सिङ सिधा र माथितिर फर्केको, शरिर बलियो भएकोले मालसमान बोक्न र खेत जोल्नको लागि उपयुक्त जात हो । अन्य स्थानीय जातका गाईहरु भन्दा ठूलो शरिर हुन्छ । यो ३.५ वर्षको उमेरमा बयस्क भई ४.५ वर्षको उमेरमा पहिलो वेत व्याउछ । यसको गर्भधारण अवधि २८८ दिनको हुन्छ । यसले ३०५ दिनको दुहुनो अवधिमा दैनिक औसत दूध उत्पादन २.५ के.जी. दिन्छ । दुई वेतको अन्तर औसत १८ महिनाको हुन्छ ।

४. पहाडी गाई:-

यो गाई मध्य पहाडको लागि उपयुक्त, प्राय कालो रंग, दूध उत्पादन क्षमता कम भएको, विषम हावापानीमा समेत हुर्कन सक्ने सानो कदको गाई हो । यो ४ वर्षको उमेरमा बयस्क



भई ५ वर्षको उमेरमा पहिलो वेत व्याउछ । गर्भधारण अवधि २७५ दिनको हुन्छ । यसको औषत शारीरिक तौल १६५ के.जी.सम्म हुन्छ । यसको दुई वेतको अन्तर औसत औषत १६-१७ महिना र २४० दिनको दुहुनो अवधिमा औषत दैनिक दूध उत्पादन १.१ के.जी. हुन्छ । पहाडी क्षेत्रको सबै तिर पाईन्छ ।

५. तराई गाई:-

तराईको समथर भू भागको लागि उपयुक्त, प्राय सेतो रंग, दूध उत्पादन क्षमता कम भएको, मध्यम कदको, कान सिधा, बलियो र गर्मी

हावापानीको लागि उपयुक्त गाई हो । यो ३.५ वर्षको उमेरमा बयस्क भई ४.५ वर्षको उमेरमा पहिलो वेत व्याउछ । यसको औषत शारीरिक तौल २१० के.जी.सम्म हुन्छ । गर्भधारण अवधि २



९६ दिनको हुन्छ । यसको दुई वेतको अन्तर औसत औषत १६-१७ महिना र २४६ दिनको दुहुनो अवधिमा औषत दैनिक दूध उत्पादन २.१ के.जी. हुन्छ ।

६. सिरी गाई:-

पूर्वी पहाडको खासगरी ईलाम जिल्लाको उत्पादनशील गाई तर हाल **लोप भईसकेका** छ । पहाडको लागि उपयुक्त, कालोदेखि सेतो रंग, दूध उत्पादन



क्षमता राम्रो भएको, चौडा र च्याप्टो निधार, कान सानो र अगाडि निस्किएको, थोरै माथी फर्केको तिखो सिङ हुन्छ । यो ३.५ वर्षको उमेरमा बयस्क भई ४.५ वर्षको उमेरमा पहिलो वेत व्याउछ । यसको औषत शारीरिक तौल २६८ के.जी.सम्म हुन्छ । गर्भधारण अवधि २९५ दिनको हुन्छ । यसको दुई वेतको अन्तर औसत औषत १७ महिना र २६८ दिनको दुहुनो अवधिमा औषत दैनिक दूध उत्पादन ४.५ के.जी. हुन्छ ।

७. याक:-

यो समुद्र सतहबाट ३००० देखि ४५०० मिटर उचाई सम्म सजिलै हुर्कन सक्दछ । यसको भालेलाई याक र पोथीलाई नाक भनेर चिनिन्छ । यसको दूध



उत्पादन क्षमता कम भएपनि दूध चिल्लो पदार्थ ६.६% सम्म हुन्छ । यसको काँध सिधा, रौ लामा, सिङ तिखो, लामो र बलियो, अत्यधिक चिसो सहन सक्ने क्षमता भएको, यो करिव ३ वर्षको उमेरमा बयस्क भई ४ वर्षको उमेरमा पहिलो वेत व्याउछ । गर्भधारण अवधि २५२ देखि २५५ दिनको हुन्छ । नाकलाई व्याएको दुई महिनासम्म दुहिदै नवजात बाछाको लागि छोडिन्छ र त्यसपछि मात्र दुहिन्छ । १६७ दिनको दुहुनो अवधिमा यसको औसत दैनिक दूध उत्पादन १.३ के.जी. हुन्छ । वयस्क याकको शारीरिक तौल अधिकतम औषत ३५५ के.जी. र नाकको ३२५ के.जी. हुन्छ ।

चौरी गाई:-

यो नेपालको उच्च पहाडी क्षेत्रमा ९ हजार देखि १५ हजार फिट सम्म पालन गरिन्छ । शुद्ध जातको भालेलाई याक र पोथीलाई नाक भनिन्छ भने वर्णशंकरलाई चौरी भनिन्छ । चौरीको भालेलाई भोपा/ भोप्के भनिन्छ, यो नपुंसक हुन्छ भारी बोक्ने र खेत जोत्न प्रयोग गरिन्छ । यसको पोथीलाई भुमा भनिन्छ यो उत्पादनशील हुन्छ । यसले दैनिक औसत ४ लिटरसम्म दूध दिन्छ ।

नाक र स्थानीय जातको वहरको कसवाट जन्मेको डिम्जो चौरी र याक र स्थानीय गाईको कसवाट जन्मेको लाई उराङ्ग चौरी भनिन्छ । डिम्जो चौरी उचाईमा गएर चर्न सक्ने, ठण्डी सहन सक्ने र दूध



उत्पादन राम्रो दिन्छ । उराङ्ग चौरी उचाईमा गएर चर्न नसक्ने, ठण्डी सहन नसक्ने र दूध उत्पादन कम हुन्छ । चौरीको दूध, चिज, बटर, घिऊ, दही, छेना, छुर्पी, चमर, छाला प्रयोगमा ल्याईन्छ । चौरी चिज (Yak cheese) पर्यटकहरू निकै रुचाउछन् र विदेशी मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत हो ।

(ख) आयातित जातहरू :

१. जर्सि गाई:-

यसको उत्पत्ति बेलायतको जर्सि टापुमा भएको हो । यो करिव त्रिभुजाकार, रंग प्रायः रातो, खैरो वा कालो, डडालु सिधा, फाँचो र थुन ठूला,



टाउको विचमा खोप्रो परे जस्तो, अनुहार छोटो र यसको भाले रिसालु हुन्छ । साँढेको शारिरीक तौल ६७५ के.जि. र माउको तौल ४५० के.जि. हुन्छ । प्रतिवेत औसत दूध उत्पादन ५००० देखि ६००० के.जी. सम्म हुन्छ । यसको दूधमा चिल्लो पदार्थ ५% र एस.एन.एफ. ९.४२ % सम्म हुन्छ ।

२.हॉलिस्टेन फ्रिजन:-

यसको उत्पत्ति नेदरल्याण्डको फ्रिजल्याण्डमा भएको हो । यो गाई संसारकै सबभन्दा बढी दूध दिने, सेतो, कालो, टाटेपाटे, ढाड अलि कुप्रेको, लामो र साँधुरो



मुख, गाई शान्त स्वभावको र साँढे हिंस्रक स्वभावको हुन्छ । साँढेको शारिरीक तौल १००० के.जी र माउ ६७५ के.जी. सम्म हुन्छ । दूध उत्पादन प्रति वेत ६५०० देखि ९००० लिटरसम्म भएतापनि ११००० लिटर भन्दा बढी दिइएको पाईन्छ । यसको दूधमा चिल्लो पदार्थ ३.४५ % र एस.एन.एफ. ८.५६% सम्म हुन्छ ।

३.ब्राउन स्वीस गाई:-

यसको उत्पत्ति स्वीजरल्याण्डमा भएको हो । यो गाई खैरो वा कालो रंगको, सुस्त र सोभो हुन्छ ।



प्रतिकूल मौसम खप्न सक्ने, डाँडाकाँडामा पनि पाल्न सकिने, गर्मिमा पनि पाल्न सकिने, शारिरीक तौल साँढेको ९०० के.जी. र माउको ६२५ के.जी.सम्म हुन्छ । औसत दूध उत्पादन प्रतिवेत ५५०० लिटरसम्म पाईन्छ । यसको दूधमा चिल्लो पदार्थ ४% र एस.एन.एफ. ९.०६% सम्म हुन्छ ।

४.साहिवाल गाई:-

यसको उत्पत्ति पाकिस्तानको मन्टगोमेरीमा भएको हो । चाकलो निधार, छोटो खुट्टा, छोटो सिङ पछाडी फर्केका, निकै ठुलो र लगभग एकतर्फ



ढल्केको जुरो तथा माल भएको हुन्छ । यसको रंग रातो र हल्का खैरो हुन्छ । यो एशियाको राम्रो दुधालु गाई हो । साँढेको तौल ५०० के.जी र माउको तौल ३४० के.जी. हुन्छ । प्रतिवेत दूध उत्पादन १३५० लिटर हुन्छ । यसको दूधमा चिल्लो पदार्थ ५% र एस.एन.एफ. ९.२% सम्म हुन्छ ।

५. रेड सिन्धी:-

यसको उत्पत्ति पाकिस्तानको सिन्धु प्रान्तमा भएको हो । यसको रंग रातो कालो, वोधो सिङ्ग भएको धेरै ठुलो जुरो तथा माल भएको, दडिलो शरिरीर



निकै शान्त प्रकृतिको, फाँचो ठूलो र तल भरेको हुन्छ । साँढेको शारिरीक तौल ४५० के.जी. र माउको ३०० के.जी.सम्मको हुन्छ । पहिलो पटक व्याउने उमेर औषत ४२ महिना हुन्छ । यसको एक बेतबाट अर्को बेतको अन्तर ४२५ दिनको हुन्छ । औसत दुध उत्पादन प्रतिवेत १५०० देखि २२०० के.जी. हुन्छ । यसको दूधमा चिल्लो पदार्थ ४.५% र एस.एन.एफ. ९.१६% सम्म हुन्छ ।

६.हरियाणा गाई:-

यसको उत्पत्ति भारतको हरियाणामा भएको हो । यसको रंग सेतो, लामा लामा खुट्टा, सलक्क परेको जीउ, अत्यन्त बलियो शारिरीक बनावट, कसिलो र अग्लो शरीर हुन्छ । यसको गाई दूध उत्पादन तथा गोरु जोत्न र गाडा तान्न निकै उपयुक्त हुन्छ । वयस्क गाईको तौल ५५० के.जी. हुन्छ । पहिलो पटक व्याउने उमेर २-५ वर्ष हुन्छ । प्रतिवेत औषत दूध उत्पादन १००० के.जी. हुन्छ । यसको दूधमा चिल्लो पदार्थ ४.५% र एस.एन.एफ. ९.१% सम्म हुन्छ । यस गाईलाई द्वि उद्देशिय गाई भनिन्छ ।



२. भैसीका जातः

(क) स्थानीय जातहरू-

(१) लिमे भैसी:-

यसको उत्पत्ति पश्चिमान्चल क्षेत्रको कास्की, स्याङ्गजा, पर्वत, वाग्लुङ्ग तनहुँ र लम्जुङ्गमा भएको हो। यो स्थानीय भैसी मध्ये सबै भन्दा सानो जातको भैसी हो।



यसको सिङ्ग घाँटीतिर घुमेको हंसिया आकारको हुन्छ घाटीमा सेता रौं भई माला जस्तो देखिनु तथा घुडा देखि तलको खुट्टाको भाग सेतो हुन्छ। छालाको रंग सेतो मिसिएको खैरो, आखि भौं पनि सेता, यो भैसीको शारिरीक तौल औषत ३१० देखि ३१५ के.जी. हुन्छ। सामान्यतया ४ वर्षको उमेरमा बाली जाने र ५ वर्षको उमेरमा व्याउछ। दुई वेतको अन्तर १९ महिना रहेको छ। दूध दिने अवधि ३०० दिनमा दैनिक औषत ३ लिटर पाइन्छ। दूधमा चिल्लो पदार्थको मात्रा ६.५ देखि ७.५ प्रतिशतसम्म पाइन्छ। यसको संख्या घट्दो क्रममा भएकोले संरक्षणको लागि ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ।

(२) पाकोटे भैसी:-

यो जातको भैसी मध्य पहाड देखि उच्च पहाडमा पाइन्छ। यसको रंग कालो हुन्छ। तर कहिकही खैरो र हल्का खैरो रंगमा पाइन्छ।



नाक कालो, अनुहार लाम्चो, टाउको चेटो, सिङ्ग तरवार आकारको र शारिरको पछाडी भागतिर फर्केको हुन्छ। सामान्यतया ४ वर्षको उमेरमा बाली जाने र ५ वर्षको उमेरमा व्याउछ। व्यान अन्तर २० महिना रहेको छ। औषत शारिरीक तौल ४५२ के.जी. र दूध दिने अवधि ३०५ दिनमा दैनिक औषत २.७७ लिटर पाइन्छ। दूधमा चिल्लो पदार्थको मात्रा ६.५ देखि ९.६ प्रतिशत र एस.एन.एफ. ११ देखि १३.४ प्रतिशतसम्म पाइन्छ। यसको संख्या घट्दो अवस्थामा रहेकोले संरक्षणमा ध्यान दिन आवश्यक छ।

(३) गड्डी भैसी:- यो सुदूर पश्चिमान्चलको पहाडी भेगमा पाइन्छ। यसको शरीर गाडी जस्तै ठूलो भएकोले गड्डी राखिएको, रंग कालो र निधारमा सेतो थोप्ला तारो भएको हुन्छ। शरिरको रंग अधिकांश सेतो खैरो र कुनैमा कालो पनि हुन्छ। लामो अनुहार, फराकिलो निधार र टाउको, सिङ्ग लामो अर्ध घुमाउरो, खुट्टा छोटो, मोटो र बलियो, पीठ धेरै चौडा र पुच्छर लामो हुन्छ। पूर्ण विकसित फाँचो, दूधका नसा स्पष्ट देखिने हुन्छ। अगाडिको भन्दा पछाडिको भाग ठूलो हुन्छ। स्थानीय भैसीहरू मध्ये सबै भन्दा ठूलो भैसी हो। यो बहुवा भन्दा चरिचरनमा

रमाउछ। सामान्यतया ३ वर्षको उमेरमा बाली जाने र दुई वेतको अन्तर २३ महिना रहेको छ। औषत शारिरीक तौल ४५२ के.जी. र दूध दिने अवधि ४२० दिनमा दैनिक औषत ३.५ लिटर पाइन्छ। यसको संख्या घट्दो अवस्थामा रहेकोले संरक्षणमा ध्यान दिन आवश्यक छ।



(ख) आयातित जात :-

१. मुराँ भैसी:-

यसको उत्पत्ति भारतको पंजाब र हरियाणाको रोहतकमा भएको हो। यो निक्कुर



कालो शरिर, लामो घाँटी, शरिरको छाला नरम, शरिरमा रौं कम, कल्चौडो तथा थुनहरू पूर्ण विकसित, लामो पुच्छर र पुच्छरको विचमा सेतो फुर्को हुन्छ। छोटा नजिकैवाट घुमेको कसिएको सिङ्ग हुन्छ। यसको शारिरीक तौल ४५० देखि ५०० के.जी र प्रतिवेत औषत दूध उत्पादन १५०० देखि २५०० लिटर हुन्छ। राम्रो व्यवस्थापनमा ३१० दिनको अवधिमा २२०० लिटर दूध उत्पादन भएको पाइन्छ। दूधमा औषत चिल्लो पदार्थ ७ प्रतिशत र एस.एन.एफ. १० देखि १२ प्रतिशतसम्म, प्रोटीन ४.५ प्रतिशत र ल्याक्टोज ४.८ प्रतिशत पाइन्छ। यो जातको भैसी दूध उत्पादनको लागि विश्व प्रसिद्ध छ। यो नवौं वेतसम्म पनि राम्रो उत्पादन दिन सक्छ।

सन्दर्भ ग्रन्थः

- १) नेपालका रैथाने घरपालुवा जनावरहरू : एक परिचय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, राष्ट्रिय पशु विज्ञान अनुसन्धान प्रतिष्ठान, पशु प्रजनन महाशाखा, खुमलटार ललितपुर, २०१२
- २) नेपालमा भैसीपालन व्यवसाय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, FFIL CR M ALSCC INPB Nepal Research Project खुमलटार ललितपुर, २०७१, मंसिर
- ३) पौडेल, डा. लोकनाथ - लुलु तथा अछामी गाईको वर्तमान अवस्था प्राविधिक मापन तथा पहिचान, केन्द्रीय गाईभैसी प्रवर्द्धन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर
- ४) पौडेल, डा. लोकनाथ - लिमे र पारकोटे भैसीको वर्तमान अवस्था प्राविधिक मापन तथा पहिचान, केन्द्रीय गाईभैसी प्रवर्द्धन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर
- ५) पौडेल, रुद्रप्रसाद - व्यवसायिक गाईभैसी पालन प्रविधि, सामुदायिक पशु विकास आयोजना हरिहरभवन, ललितपुर ०७०/०७१
- ६) ढकाल, टंक प्रसाद / धिमिरे, डा. शिव चन्द्र- पशु सेवा पुस्तिका, श्रीमती कमला ढकाल, २०४८ भरतपुर, चितवन
- ७) शर्मा, डा. भुवनेश्वर - चौरी पालन , पशु सेवा तालिम तथा प्रसार निर्देशनालय हरिहरभवन, ललितपुर , २०६४ चैत्र
- ८) के.सी., क्षेत्र बहादुर- चौरी पालन , लाइभष्टक, वर्ष ९, अंक १२, कार्तिक २०५३, नेपाल एनिमल साइन्स एसोसियसन (नासा) काठमाण्डौ
- ९) कृषि डायरी २०७१, कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुर

संरक्षकः

कार्यालय प्रमुख, डा. रेशम राज ज्ञवाली

सम्पादक मण्डलः

संयोजक : डा. जगदिश पाण्डेय, प.वि.अ

सदस्यहरू : श्री बासुदेव नाथ, प.वि.अ

श्री सुमन कुँवर, प.से.प्रा.

श्री पुष्पराज सिग्देल, ना.प.से.प्रा.

केन्द्रीय गाईभैसी प्रवर्द्धन कार्यालय, हरिहरभवन

श्री

.....

प्रकाशक :

नेपाल सरकार, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, पशु उत्पादन निर्देशनालय, केन्द्रीय गाईभैसी प्रवर्द्धन कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर

फोन नं. : ५५३०८४६, फ्याक्स : ५५३८९०२, Website: www.ccbpo.gov.np, email: ccbpo@gmail.com